

Natriumhypochlorit (Blegeessens)



Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

PRODUKTTYPE	Klorholdigt desinfektionsmiddel
ANVENDELSE	Natriumhypochlorit anvendes som blegemiddel i vaskerier og i tekstilindustrien, til desinfektion af svømmebade samt til desinfektion i landbrug og i fødevarerindustrien.
EGENSKABER	Natriumhypochlorit er et alkalisk og bredspektret desinfektionsmiddel. Ved opvarmning eller sammenblanding med syre udvikles frit klor. Produktet virker baktericidt og fungicidt. Produktet er virusaktivt.
MATERIALE FORENELIGHED	Angriber ved længere tids brug metaller som f.eks. jern, messing og aluminium.
OPBEVARING	Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbevares i beholder med modstandsdygtig foring. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Materialer, der skal undgås: Stærke syrer, alkalimetaller, metalpulver, oxiderende materialer og aminer. Kontakt med metaller kan resultere i nedbrydning med dannelsen af ilt. Opbevaringstemperatur: -10 - 25 °C Holdbarhed: 6 måneder
GODKENDELSE	Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer: 462-555-0/97. DK: 4109311 Produktet er omfattet af den europæiske biocidforordning. Kun til erhvervsmæssig brug.
SIKKERHED	Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.
MILJØFORHOLD	Produktet er meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Store mængder af produktet kan påvirke surhedsgraden (pH-værdien) i vandmiljøet med risiko for skadevirkninger for vandorganismer. Produktet består udelukkende af uorganiske stoffer, som ikke nedbrydes biologisk. Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Til desinfektion med 200 ppm aktiv chlor anvendes en koncentration på 0,16% (svarende til 0,13 dl pr. 10 liter vand).

Overfladedesinfektion

Dosering: 3,1 – 6,1%.

Temperatur: 10-20°C

Kontaktid: 5-15 min.

CIP desinfektion

Dosering: 0,16-6,1 w/w %

Temperatur: 10-40°C

Kontaktid: 5-15 min

Kasse/emne- vask

Dosering: 0,2 – 1 %

Temperatur: Overfladen på emnet skal være 10 – 40°C

Kontaktid: Afhængig af maskintype og applikation kan tilfredsstillende effekt opnås ved kortere indvirkningstid.

Blegning af tekstiler

Dosering: 3-6 ml / pr. kg tøj

Temperatur: 40-50°C

Det anbefales, at overflader, som kommer i forbindelse med fødevarer, skylles med drikkevand efter endt desinfektion.

Varen forhandles i plastemballage og må ikke omhældes på metal.

VED KONTAKT MED SYRE UDVIKLES GIFTIG GAS.

PRODUKTDATA

Farve	Gullig
Tilstandsform	Flydende
Lugt	Chlor
Vægtfylde	1,20 kg/l
pH	I leveringstilstand ~ 13,0
	I vandig opløsning 0,16% ~ 8,5
	0°dH
	I vandig opløsning 3,0% 11,0

BORTSKAFFELSE

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

EMBALLAGE

Plastdunk	10 L, 20 L
Plasttromle	200 L
IBC	775 L, 1000 L

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.